

TRIGONUM CAROTICUM

- ohr.: a) kran.: venter post. m. digastrici, m. stylohyoideus
b) ventrokaud.: venter sup. m. omohyoidei
c) (dorso)lat.: přední okraj m. sternocleidomastoideus
- povrch. vrstvy: a) kůže - jemná
b) m. platysma + řídké podkoží - zde *n. transversus colli + r. colli n. facialis*
c) podkožní žíly - var. průběh, př. *v. facialis, v. retromandibularis*
d) povrchová fascie = *lamina spfc. fasciae cervicalis*
- obsah:
 - a) **cévy:** viz. systematická anatomie
 - a. carotis comm.: dělí se v úrovni *cornua majora ossis hyoidei* na *a. carotis ext. et int.*; v místě bifurkace - *glomus caroticum* (průměr cca. 5 mm)
 - a. carotis int. - stoupá nejprve dorsolaterálně od a. carotis ext., pak dorsomediálně
 - a. carotis ext. - větve: ventrální, mediální, dorzální (*a. occipitalis*)
 - v. jugularis int. (VJI) - sestupuje pod povrch. fascií, laterálně od tepen; podél žíly - *nodi lymphatici cervicales profundi*
 - b) **nervy:** viz. systematická anatomie
 - n. hypoglossus (n. XII) - *ansa n. hypoglossi*
 - ansa cervicalis prof.
 - n. vagus (n. X) - spolu s tepnami (*a. carotis int. + comm.*) a *v. jugularis int.* => **krční nerv.-cév. svazek** (obalen vazivovou pochvou); ve svazku dorzálně od cév; vydává *n. laryngeus sup.*
 - truncus sympathicus
- **angulus Beclard-Hütter**
 - ohr.: a) kran.: venter post. m. digastrici, m. stylohyoideus
b) kaud.: *cornua majora ossis hyoidei*
c) dno: m. hyoglossus
 - zde odstup a. lingualis
- **trigonum Guyoni**
 - ohr.: a) kran.: venter post. m. digastrici
b) dorsolat.: VJI
c) ventrokaud.: *truncus thyreolinguofacialis*
- **trigonum Farabeufi**
 - ohr.: a) kran.: n. XII, b) dorsolat.: VJI, c) ventrokaud.: *truncus thyreolinguofacialis*

Pozn.: Trigonum Guyoni + Farabeufi - místo podvazu *a. facialis* a *a. lingualis*.