

BŘIŠNÍ KRAJINY

- pro základní orientaci na břicho byly stanoveny základní orientační čáry (příčné a podélné) – pomocí nich se vymezují jednotlivé základní krajiny břišní (regiones abdominales); mají význam při: fyzikálním vyšetření nemocného (palpace břicha), ultrazvukovém vyšetření břicha, popisu a hodnocení nálezů na rtg snímcích, CT, nebo MRI
- **rozlišujeme:**
 - příčné (tranzversální) čáry:
 - **linea xiphisternalis:** probíhá v úrovni xiphisternálního spojení, ve výši brániční klenby (Th₁₀)
 - **linea transpylorica:** probíhá v úrovni pyloru (vrátníku), resp. v úrovni spojnice konců chrupavek 9. žeber (L₁)
 - **linea subcostalis:** v úrovni tzv. kostoabdominálních hrbolků (L₃↑)
 - **linea bispinalis (s. interspinalis):** v úrovni spina iliaca ant. sup. (promontorium)
 - podélné (longitudinální) čáry:
 - bývá různě definována, např. jako: a) spojnice kostoabdominálních hrbolků a tuberculum pubicum, b) vertikála, probíhající středem lig. inguinale, c) čára probíhající v lat. okraji m. obliquus externus abdominis
- pomocí těchto čar pak vymezujeme zákl. krajiny břišní:
 - **regio abdominis sup. (epigastrium):** mezi xiphisternální čarou a subkostální čarou; dolními oblouky žeber se dělí na: dvě postranní části – regio hypochondriaca dx./sin., a jednu centrální část – regio epigastrica (nadbříšek)
 - **regio abdominis media (mesogastrium):** mezi subkostální a interspinalní čarou; pomocí podélných čar toto regio rozděleno na: dvě postranní části – regio abdominis lateralis dx./sin., jednu centrální část – regio umbilicalis (tzv. krajina pupku)
 - **regio abdominis inf. (hypogastrium): ohraničení:** a) kran.: linea bispinalis (s. inter-spinalis), b) lat.: sulci inguinales, c) kaud.: symfýza; podélnými čarami krajina dělena na: dvě postranní části – **regio inguinalis dx./sin.** (tříselná krajina, tříselo), jednu centrální část – **regio pubica** (podbříšek)