

REGIO AXILLARIS

- jamka, která má při mírné abdukci paže tvar čtyřbokého jehlanu s vrcholem nahoře (u 1. žebra) a basí směřující kaudálně
- kůže tohoto regia je jemná, nachází se zde četné mazové žlázy a chlupy (hirci)
- **ohraničení:**
 - mediálně: hrudní koš, m. serratus ant.
 - laterálně: humerus, m. coracobrachialis, caput breve m. bicipitis brachii, caput longum m. tricipitis brachii
 - přední stěna: m. pectoralis major (jehož dolní okraj tvoří přední axillární čáru), m. pectoralis minor, m. subclavius (pozn. tyto dva svaly jsou zavzaty do fascia clavipectoralis)
 - zadní stěna: m. subscapularis s ventrální plochou lopatky, m. teres major, m. latissimus dorsi (jež zvedá zadní axillární řasu)
 - vrchol: trojúhelníkovitý tvar tvořen lopatkou, klíční kostí a 1. žebrem
 - base: axillární fascie (přechod mezi fascia pectoralis superficialis a fascia brachialis, v centrální části je perforovaná, jinak jemná, často tvořena několika lamelami); **fascia clavipectoralis** se do ní upíná shora a táhne ji vzhuru
- **obsah regia:** *a. axillaris* (její začátek je v úrovni prvního žebra, konec pak při collum chirurgicum humeri, je volným pokračováním *a. subclavia*), *v. axillaris* (leží nejmediálněji ve svazku, ventromediálně od tepny), *pars infraclavicularis plexus brachialis*, *n. et vasa thoracodorsalia*, *a. thoracica lateralis*, *n. thoracicus longus*, *vv. thoracoepigastricae*, *nn. intercostobrachiales*, *n. axillaris*, *mizní uzliny* (nll. apicales, centrales, brachiales, subscapulares, pectorales, interpectoriales)
- **komunikace:**
 - s otvory v dorsální stěně axilly (*foramen humerotricipitale* (a. circumflexa humeri post., n. axillaris), *foramen omotricipitale* (a. circumflexa scapulae))
 - s trig. colli laterale (prochází zde *a. axillaris*, *v. axillaris*, plexus brachialis)
 - s trig. deltoideopectorale (otvorem v klavipektorální fascii (fossa ovalis infraclavicularis - v. cephalica, a. thoracoacromialis))