

## REGIO GENUS ET FOSSA POPLITEA

- vymezení: a) prox.: tranzverzální rovina nad bazí pately, b) dist.: transverzální rovina procházející tuberositas tibiae

### Regio genus ant.

- palpace: patella, lig. patellae, části kondylů femuru, tibie, hlavice fibuly
- vrstvy:
  - **kůže**: silná, proti spodině dobře posunlivá; inerv.: větve z n. femoralis
  - **podkoží**: přítomna bursa subcutanea praepatellaris, med.: ↑ v. saphena magna || n. saphenus (pozn.: k žíle se přikládá při zadním okraji m. sartorius)
  - **fascie**: tenká, pokračování fascia lata femoris; pod fascií **bursa subfascialis praepatellaris**, na ventr. ploše pately **bursa subtendinea praepatellaris**, dist.: **bursa subcutanea infrapatellaris**, **bursa subcutanea tuberositatis tibiae**; pod fascií: úpon. šlacha m. quadriceps femoris (do něj zavzata patela); lat.: (na zevní okraj tibie) → úpon: *tractus iliotibialis*; med.: pes anserinus spfc.
- obsah: art. genus
- topograf. útvary:
  - **pes anserinus major** - společný úpon m. sartorius, m. gracilis et m. semitendinosus mediálně u tuberositas tibiae
  - **pes anserinus prof.** - úpon m. semimembranosus: a) k med. kondylu tibie, b) mediálně od tuberositas tibiae, c) do lig. popliteum obliquum, d) do fascia poplitea

### Regio genus post. et fossa poplitea

- **fossa poplitea** (rombický tvar)
  - ohraničení: proximolat.: m. biceps femoris, proximomed.: m. semitendinosus, m. semi-membranosus, distolat.: m. gastrocnemius lat., m. plantaris, distomed.: m. gastrocnemius med.
  - části: **dno**: ↓ facies poplitea femoris, capsula art. genus, m. popliteus, **strop**: fascia poplitea (→ v. saphena parva do v. poplitea)
  - obsah: a. poplitea, v. poplitea, n. tibialis, n. peronaeus comm., nodi lymph. poplitei, tuk. tkáň
  - vrstvy: **kůže**: jemná, proti spodině posunlivá, **podkoží**: tuk. vazivo